

Ch. 4. 導来圏, 半直交分解と例外生成列

§ 4.1. 代数多様体の導来圏の不変量.

X, Y ; smooth projective algebraic varieties / \mathbb{C} .

$D^b(X), D^b(Y)$; derived categories.

$$(D^b(X) = D^b(\text{Coh}(X)))$$

$\Phi : D^b(X) \rightarrow D^b(Y)$; (\mathbb{C} -linear) equiv.

あるとき, X と Y は 導来同値, Fourier-Mukai
変換 である といふ.
(Y は X^α)

(Thm 2.53 (Orlov)) より, 図式

$$\begin{array}{ccc} & X \times Y & \\ \pi_X \swarrow & & \searrow \pi_Y \\ X & & Y \end{array}$$

に對して, $\exists P \in D^b(X \times Y)$ s.t.

$$\Phi \cong \Phi_{X \rightarrow Y}^P$$

$$\left(\Phi_{X \rightarrow Y}^P(-) := \mathbb{R} \pi_{Y*} (P \otimes^L \mathbb{L} \pi_X^+(-)) \right)$$

Lem 4.1

$$\left[\begin{array}{l} X \sim Y \text{ なら 導来同値} \quad (\text{i.e. } D^b(X) \simeq D^b(Y)) \\ \Rightarrow \dim(X) = \dim(Y) \end{array} \right.$$

②

$X \sim Y$ なら 導来同値 好んで. $D^b(X) \xrightarrow{\Phi} D^b(Y)$

$$\exists P \in D^b(X \times Y) \text{ s.t. } \Phi \simeq \Phi_P$$

$$(\Phi_P(-) := R\pi_{Y*}(P \otimes^L \pi_X^*(-)))$$

このとき, (3.1) より, Φ_P の 左随伴, 右随伴 写像は

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_{Y \rightarrow X}^{P_L}, \quad P_L := P^V \otimes^L \pi_Y^* \omega_Y[\dim Y] \quad (\text{左}) \\ \Phi_{Y \rightarrow X}^{P_R}, \quad P_R := P^V \otimes^L \pi_X^* \omega_X[\dim X] \quad (\text{右}) \end{array} \right.$$

と表せる. Φ は 圏同値 好んで.

$$\Phi^{-1} \simeq \Phi_{Y \rightarrow X}^{P_L} \simeq \Phi_{Y \rightarrow X}^{P_R}$$

積分核の一意性から,

$$P^V \otimes^L \pi_Y^* \omega_Y[\dim(Y)] \simeq P^V \otimes^L \pi_X^* \omega_X[\dim(X)]$$

$$\therefore P^V \otimes \pi_X^* \omega_X \simeq P^V \otimes^L \pi_Y^* \omega_Y [\dim(Y) - \dim(X)]$$

P^V は bounded derived cat. の object 好んで.

$$\dim(X) = \dim(Y)$$

以下. 他の不変量を探る

Def

A : Abel 圏 (より一般に完全圏) とする.

A に対し. その Grothendieck 群 $K(A)$ を次のように定義:

• A のおぼての対象の同型類 $[E]$ で
自由に生成される Abel 群 $(\bigoplus_{E \in A} \mathbb{Z}[E])$ を
その部分群.

$\langle [F] - [E] - [G] \mid \exists 0 \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0 : \text{exact} \rangle$

で割ったもの $K(A)$ とする.

$$\begin{array}{ccc} \text{例} & \bigoplus_{V \in \text{Vect}(\mathbb{C})} \mathbb{Z}[V] / \sim & (V \simeq \mathbb{C}^{\dim V}) \\ \text{由 4.2} & \parallel & \\ \varphi: K(\text{Vect}(\mathbb{C})) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & \cup & \cup \\ & \pm [V] & \longmapsto \pm \dim(V) \end{array}$$

φ は 全単射.

$$0 \rightarrow V^0 \rightarrow V^1 \rightarrow V^2 \rightarrow 0 \quad \text{ex. } \mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{C}$$

$$[V^1] = [V^0] + [V^2]$$

$$\dim V^1 = \dim V^0 + \dim V^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \varphi([V^0] + [V^2]) &= \varphi([V^1]) \\ &= \dim V^1 \\ &= \dim V^0 + \dim V^2 \\ &= \varphi([V^0]) + \varphi([V^2]). \end{aligned}$$

Def

\mathcal{D} : 三角圏 とす.

\mathcal{D} の Grothendieck 群 $K(\mathcal{D})$ を次のように定義 :

• \mathcal{D} の対象の同型類 $[E]$ で自由に生成される Abel 群 \mathcal{E} . その部分群

$$\langle [F] - [E] - [G] \mid \exists E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E \rangle$$

exact, tri.

で割り、たものが $K(\mathcal{D})$.

$$\bigoplus_{E \in \mathcal{D}} \mathbb{Z}[E] / \sim$$

例 4.3 (例)

三角圏



A : Abel 圏, $D^b(A)$: A の導来圏.

($K(A)$ の中 \mathbb{Z}^n)

(i) $E^\bullet \in D^b(A)$ に \exists \mathcal{L} . $K(D^b(A))$ の中 \mathbb{Z}^n .


$$[E^\bullet] = \sum_i (-1)^i [E^i] = \sum (-1)^i [\mathcal{H}^i(E^\bullet)]$$

(ii) $K(A) \xrightarrow{\sim} K(D^b(A))$.

(*)

(i) $K(A)$ の中 \mathbb{Z}^n 次を示す :

$$\sum_i (-1)^i [E^i] = \sum_i (-1)^i [\mathcal{H}^i(E^\bullet)]$$



$$0 \rightarrow \ker(d^i) \rightarrow E^i \rightarrow \text{Im}(d^i) \rightarrow 0.$$

$$0 \rightarrow \text{Im}(d^{i-1}) \rightarrow \ker(d^i) \rightarrow \mathcal{H}^i(E^\bullet) \rightarrow 0.$$

\mathbb{Z}^n exact となる.

$$[\mathcal{H}^i(E^\bullet)] = [\ker(d^i)] - [\operatorname{Im}(d^{i-1})]$$

$$[E^i] = [\ker(d^i)] + [\operatorname{Im}(d^i)]$$

$$\therefore \sum_i (-1)^i [E^i] = \sum_i (-1)^i ([\ker(d^i)] + [\operatorname{Im}(d^i)])$$

$$= \dots - [\operatorname{Im}(d^{-1})]$$

is ≥ 1 ...
↙

$$+ [\ker(d^0)] + [\operatorname{Im}(d^0)]$$

$$- [\ker(d^1)] - [\operatorname{Im}(d^1)]$$

+ ...

$$= \sum_i (-1)^i ([\ker(d^i)] - [\operatorname{Im}(d^{i-1})])$$

$$= \sum_i (-1)^i [\mathcal{H}^i(E^\bullet)]$$

$$(ii) \quad \mathcal{E}^\bullet \simeq \mathcal{F}^\bullet \quad \text{in } \mathcal{D}^b(A) \text{ iff}$$

$$\forall_i, \mathcal{H}^i(\mathcal{E}^\bullet) = \mathcal{H}^i(\mathcal{F}^\bullet)$$

i. (i) ∇ .

$$[\mathcal{E}^\bullet] = [\mathcal{F}^\bullet]$$

in $K(\mathcal{D}^b(A))$.

$$\begin{aligned} \zeta : K(D^b(A)) &\longrightarrow K(A) \\ \downarrow \wr & \downarrow \wr \\ [\mathcal{E}^\bullet] &\longmapsto \sum_{\mathbb{Z}} (-1)^i [\mathcal{E}^i] \\ &= \sum_{\mathbb{Z}} (-1)^i [\mathcal{H}^i(\mathcal{E}^\bullet)] \end{aligned}$$

とある.

$D^b(A)$ 上 dist. tri.

$$\mathcal{E}^\bullet \rightarrow \mathcal{F}^\bullet \rightarrow \mathcal{G}^\bullet \rightarrow \mathcal{E}^\bullet[1]$$

これを取れば,

$$\begin{aligned} \dots &\rightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{E}^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{F}^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet) \\ &\rightarrow \mathcal{H}^{i+1}(\mathcal{E}^\bullet) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

は A 上 n long ex. sq.

$$\begin{aligned} \therefore \zeta([\mathcal{F}^\bullet]) &= \sum_{\mathbb{Z}} (-1)^i [\mathcal{H}^i(\mathcal{F}^\bullet)] \\ &= \sum_{\mathbb{Z}} (-1)^i ([\mathcal{H}^i(\mathcal{E}^\bullet)]) + \sum_{\mathbb{Z}} (-1)^i ([\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet)]) \\ &= \zeta([\mathcal{E}^\bullet]) + \zeta([\mathcal{G}^\bullet]) \end{aligned}$$

$$\therefore \zeta([\mathcal{E}^\bullet] + [\mathcal{G}^\bullet]) = \zeta([\mathcal{E}^\bullet]) + \zeta([\mathcal{G}^\bullet])$$

ζ は group hom.

$$\zeta^{-1} : K(A) \longrightarrow K(D^b(A)) ; [\mathcal{E}] \mapsto [\mathcal{E}^\bullet]$$

以下, $K(A)$ と $K(D^b(A))$ は同一視される.

X : Smooth Projective algebraic variety

$$D := D^b(X) \quad (= D^b(\text{Coh}(X))) \quad \text{etc.}$$

X の 局所自由層 による完全圏の Grothendieck 群を $K(X)$ とおく.

Lem

X 上の 任意の 連接層 E は, 局所自由層 による有限の長さを持つ複体と擬同型となる.

③ Huy. Prop 3.26, Hartshorne Ch.3 ex. 6.9. など.

$$n = \dim(X) \quad \text{etc.}$$

$$0 \rightarrow E_n \rightarrow E_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow E_1 \rightarrow E_0 \rightarrow E \rightarrow 0$$

E_i : locally free sheaf.

命題 4.3 は因 $n \neq 1$ なら,

$$K(X) \simeq K(D^b(X)).$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{局所自由層} \\ E_i \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{連接層} \\ E \end{array} \right)$$

$E, F \in D^b(X)$ に対し. $K(X)$ での積 \cdot .

$$[E] \cdot [F] := [E \otimes F]$$

と定めることができる. $K(X)$ は $[\mathcal{O}_X]$ を単位元とした環構造を持つ. (Grothendieck 環)

Rem

(locally free にしない. \otimes しか上手に定まらない.)

(Huybrechts P.98 など)

Coniveau フィルトレーション

$$\text{Coh}^{\geq i}(X) := \{ F \in \text{Coh}(X) \mid \text{codim}_x(\text{Supp}(F)) \geq i \}$$

とおくと. $\forall i \in \mathbb{Z}$, $\text{Coh}(X)$ の部分 Abel 圏.

そこで. 自然な写像

$$K(\text{Coh}^{\geq i}(X)) \longrightarrow K(\text{Coh}(X))$$

の像を

$$F^i(K(X)) := \text{Im}(K(\text{Coh}^{\geq i}(X)) \rightarrow K(\text{Coh}(X)))$$

と定める. これは $K(X)$ の filtration を定める.

$$F^i(K(X)) \cdot F^j(K(X)) \subset F^{i+j}(K(X))$$

と成る.

$$\text{Gr}^i(K(X)) := F^i(K(X)) / F^{i+1}(K(X))$$

と成る.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{rank} : \text{Gr}^0(K(X)) \longrightarrow A^0(X) \cong \mathbb{Z}. \\ \text{det} : \text{Gr}^1(K(X)) \longrightarrow A^1(X) = \text{Pic}(X). \\ c_2 : \text{Gr}^2(K(X)) \longrightarrow A^2(X) \end{array} \right.$$

は同型 (Fulton Ex 15.3.6).

三角圏の同値 $\Phi : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ が与えられているとき.

Φ は dist. tri. を dist. tri. に移す.

\therefore それらの Grothendieck 群 $K(\mathcal{D}_1), K(\mathcal{D}_2)$ は同型.

特に, X と Y が Fourier 同値 \Leftrightarrow "同型".

それらの Grothendieck 群 $K(X), K(Y)$ は同型.

Thm 4.5 (Grothendieck - Riemann - Roch の定理)

Smooth quasi-projective varieties の間の射影射

$$f: X \rightarrow Y$$

に対し.

次の図式が可換となる:

$$\begin{array}{ccc} D^b(X) & \xrightarrow{Rf_*} & D^b(Y) \\ \text{ch}(-)td_X \downarrow & & \downarrow \text{ch}(-)td_Y \\ A(X)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{f_*} & A(Y)_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

$Y = \text{Spec}(\mathbb{C})$ とし次を得る.

Cor 4.6 (Hirzebruch - Riemann - Roch の定理).

X : smooth projective variety と

$E \in D^b(X)$ に対し.

$$\chi(E) = \int_X \text{ch}(E)td_X$$

が成立.

$E, F \in D^b(X)$ に対して. Euler 形式 (Euler form) χ .

$$\chi(E, F) := \sum_{i \in \mathbb{Z}} (-1)^i \dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}^i(E, F)$$

$$\left(\begin{aligned} &= \sum_{i \in \mathbb{Z}} (-1)^i \dim_{\mathbb{C}} \text{Ext}^i(E, F) \\ &= \sum_{i \in \mathbb{Z}} (-1)^i \dim_{\mathbb{C}} H^i(X, E^\vee \otimes F). \end{aligned} \right)$$

と定める. これは,

$$\chi(-, -) : K(X) \times K(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad (\text{bilinear form})$$

$$\chi(E, F) = \int_X \text{ch}(E^\vee \otimes F) \text{td}_X$$

と計算できる (Hirzebruch - Riemann - Roch)

$$\exists \Phi : D^b(X) \xrightarrow{\sim} D^b(Y)$$

$$\text{if } \exists \Phi, \text{ Hom}(E, F) = \text{Hom}(\Phi(E), \Phi(F)) \quad \text{if } \exists \Phi.$$

$K(X), K(Y)$ の同型 (Euler 形式 χ を保つ)

$$K(X) \times K(X) \xrightarrow{\chi(-, -)} \mathbb{Z}$$

$$\downarrow$$

$$\hookrightarrow \parallel$$

$$K(Y) \times K(Y) \xrightarrow{\chi(-, -)} \mathbb{Z}$$

問 4.7

X : smooth projective variety, $\dim X = n$.

X の コホモロジ-環 の 元

$$v = (1, a_1, a_2, \dots, a_n) \in H^{2*}(X, \mathbb{Q})$$

$$(a_i \in H^{2i}(X, \mathbb{Q}))$$

に 対し. $u = (1, b_1, b_2, \dots, b_n) \in H^{2*}(X, \mathbb{Q})$

で あらう.

$$(u, u) = v \quad ((-, -) \text{ は カッパ種})$$

と なる もの が 一意的 に 存在.

この u を \sqrt{v} と かく.

$\alpha \in K(X)$ に 対し. Mukai 同値

$$v(\alpha) \in H^{2*}(X, \mathbb{Q})$$

と.

$$v(\alpha) := \text{ch}(\alpha) \int \text{td}_X$$

で 定義.

$$E \in D^b(X) \text{ に 対しては } v(E) := v([E]) \text{ と する.}$$

Prop 4.8

X, Y : smooth proj. var.

$P \in D^b(X \times Y)$ を核とした Fourier-変換

$$\Phi_{X \rightarrow Y}^P : D^b(X) \xrightarrow{\sim} D^b(Y)$$

が与えられているとする。このとき図式

$$\begin{array}{ccc} D^b(X) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X \rightarrow Y}^P} & D^b(Y) \\ [-] \downarrow & & \downarrow [-] \\ K(D^b(X)) \cong K(X) & \longrightarrow & K(Y) \cong K(D^b(Y)) \\ \nu(-) \downarrow & & \downarrow \nu(-) \\ H^*(X, \mathbb{Q}) & \xrightarrow[\phi_{X \rightarrow Y}^P]{} & H^*(Y, \mathbb{Q}) \end{array}$$

は可換な図式。 $\phi_{X \rightarrow Y}^P$ は \mathbb{Q} 上のベクトル空間の間の同型を与えらる。

ここで $\phi_{X \rightarrow Y}^P$ は

$$\begin{array}{ccc} H^*(X, \mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^*(Y, \mathbb{Q}) \\ \cup & & \cup \\ \beta & \longmapsto & \pi_{Y*}(\nu(P) \cdot \pi_X^*(\beta)) \end{array}$$

と与えられる。

(批 復 日)

おわり分けてない。
↓

Rem

$\phi_{X \rightarrow Y}^P$ は \mathbb{C} ホモジ - の 次数 を 保たない。
 cf. Thm 2.54 2⁴. $\bigoplus_{A \rightarrow B}^P (\mathcal{O}_A)$ は A 上の
 line bundle. だから, $\phi_{A \rightarrow B}^P$ は
 \mathbb{C} ホモジ - の 次数 を 保たない。

Cor 4.9

X と Y 全導来同値なら,
 $e(X) = e(Y)$

(1)

(Prop 4.8) 2⁴. $\nu(P) \in H^{2*}(X \times Y, \mathbb{Q})$ 且,
 $\phi_{X \rightarrow Y}^P$ は $H^*(X, \mathbb{Q}), H^*(Y, \mathbb{Q})$ の
 奇数次部分, 偶数次部分 を 保つ。

$$\text{i.e.} \begin{cases} \phi(H^{\text{even}}(X)) \subset H^{\text{even}}(Y) \\ \phi(H^{\text{odd}}(X)) \subset H^{\text{odd}}(Y) \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{2} \\ \alpha := \nu(P) = \text{ch}(P) \sqrt{\text{td}(X \times Y)} \\ \phi_{X \rightarrow Y}^P : H^*(X, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^*(Y, \mathbb{Q}) \\ \begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ \beta & \longmapsto & \pi_{Y*}(\nu(P) \cdot \pi_X^*(\beta)) \\ & & \underbrace{\phantom{\pi_{Y*}(\nu(P) \cdot \pi_X^*(\beta))}}_{H^{2*}(X \times Y, \mathbb{Q})} \end{array} \end{array} \right)$$

$$e(X) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} (-1)^i \dim H^i(X, \mathbb{Q}) \quad e_Y \text{ かつ } \circ k.$$

X : Smooth proj. var.

以下、 X に対する Hochschild コホモロジー (ホモロジー) を定義する。

$HH(X)$: 2重次数付環 を次のように定める:

$$\Delta : X \hookrightarrow X \times X \quad ; \text{ diagonal embedding}$$

に対し、アーベル群

$$HA_{k,l}(X) := \text{Ext}_{X \times X}^k(\mathcal{O}_\Delta, \omega_\Delta^l)$$

を定め

$$HH(X) := \bigoplus_{k,l} HA_{k,l}(X)$$

とする。

$HH(X)$ に次のように積構造を与えよ: $\text{Ext}_{X \times X}^k(\mathcal{O}_\Delta, \omega_\Delta^m)$

$$\varphi \in HA_{k,l}(X), \quad \psi \in HA_{k',m}(X)$$

に対し、 $\varphi \in$

$$\text{Ext}_{X \times X}^k(\omega_\Delta^l, \omega_\Delta^{m+l}) \cong \text{Ext}_{X \times X}^{k'}(\mathcal{O}_\Delta \otimes_{\mathbb{P}^1} \omega_X^l, \omega_\Delta \otimes_{\mathbb{P}^1} \omega_X^m)$$

と見て、導来圏の射として φ と合成させ。

$$\varphi \cdot \psi := \varphi \circ \psi \in \text{Ext}_{X \times X}^{k+k'}(\mathcal{O}_\Delta, \omega_\Delta^{l+m}) = HA_{k+k', l+m}(X)$$

を定め、

これにより $HH(X) (= \bigoplus_{k,l} HA_{k,l}(X))$ は
2重次数付き環 と呼ぶ。

Def 4.10

X : smooth projective variety

k 番目の Hochschild コホモロジー- を次で定義.

$$HH^k(X) := HA_{k,0}(X) = \text{Ext}_{X \times X}^k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

k 番目の Hochschild ホモロジー- を次で定義.

$$HH_k(X) := HA_{k+\dim(X),1}(X) = \text{Ext}_{X \times X}^{k+\dim(X)}(\mathcal{O}_X, \omega_X)$$

各次数の Hochschild コホモロジー- の直和

$$HH^*(X) := \bigoplus_k HH^k(X) = \bigoplus_k HA_{k,0}(X)$$

$$(\text{=} \bigoplus_k \text{Ext}_{X \times X}^k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X))$$

は $HH(X) = \bigoplus_{k,l} HA_{k,l}(X)$ の次数付き部分環 と呼ぶ。

これを Hochschild コホモロジー- 環 と呼ぶ。

また、各次数の Hochschild ホモロジ- の直和

$$HH_*(X) := \bigoplus_k HH_k(X) = \bigoplus_k HA_{k+\dim(X),1}(X)$$

は、 $HH^*(X)$ 上の次数付き左加群の構造が入る。

Thm 4.11

X, Y : smooth projective varieties

X, Y は互いに導来同値である。 ($D^b(X) \simeq D^b(Y)$)

このとき、2重次数付き環の同型、

$$HH(X) \simeq HH(Y)$$

が得られる。

この同型を通じて、その部分環である Hochschild ホモロジ- 環の同型

$$HH^*(X) \simeq HH^*(Y)$$

が得られ、さらに、次数付き加群の同型

$$HH_*(X) \simeq HH_*(Y)$$

が存在する。

2重次数付環

$$HH(X) = \bigoplus_{k,l} HA_{k,l}(X)$$

の $k=0, l \geq 0$ を考えよう.

$$R(X) := \bigoplus_{l \geq 0} HA_{0,l}(X) = \bigoplus_{l \geq 0} H^0(X, \omega_X^l)$$

が得られる. (canonical ring)

小平次元 $k(X)$ を

$$\begin{cases} R(X) = 0 & \Rightarrow k(X) = -\infty \\ R(X) \neq 0 & \Rightarrow k(X) = \text{tr. deg}_{\mathbb{C}}(R(X)) - 1 \end{cases}$$

で定める.

Cor 4.12

X, Y : smooth projective varieties, 等束同値.

このとき.

$$R(X) \simeq R(Y), \quad \text{つまり} \quad k(X) = k(Y)$$

Lem 4.13

X : proj. var.

\mathcal{L} : X 上の ample line bundle.

$$R := \bigoplus_{i \geq 0} H^0(X, \mathcal{L}^i) \quad \text{et cetera.} \quad X \cong \text{Proj}(R)$$

K_X, K_Y がいずれも (anti-) ample ならば.

(Lem 4.13). (Cor 4.12) により

$$X \cong \text{Proj}(R(X)) \cong \text{Proj}(R(Y)) \cong Y$$

Thm 4.14

X : smooth quasi-proj. var.

このとき、 \mathbb{P}^n 上の空間と同型

$$\begin{cases} HH^n(X) \cong \bigoplus_{p+q=n} H^q(X, \Lambda^p TX) \\ HH_n(X) \cong \bigoplus_{q-p=n} H^q(X, \Omega_X^p) \end{cases}$$

がいずれも存在.

Cor 4.16

X, Y : 等来同值好 smooth proj. var. 证明.

$$\left\{ \begin{array}{l} \bigoplus_{p+q=n} H^q(X, \Lambda^p T_X) \cong \bigoplus_{p+q=n} H^q(Y, \Lambda^p T_Y) \\ \bigoplus_{q-p=n} H^q(X, \Omega_X^p) \cong \bigoplus_{q-p=n} H^q(Y, \Omega_Y^p). \end{array} \right.$$