

§ 3.5 ファイバー束と群の作用

ファイバー束 F 上の群の作用として $\text{Homeo}(F)$ を考えよう。

まず、群の作用の定義を、位相群の位相空間への作用に拡張しておく。

Def 3.5.1

G : 位相群

X : 位相空間. である。

G の X への 右からの作用 とは、連続写像

$$\mu: X \times G \rightarrow X$$

であらう。次の条件を満たすもの:

(1) $\forall x \in X, \mu(x, e) = x$. つまり,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{1_X \times C_e} & X \times G \\ & \searrow = & \downarrow \mu \\ & & X \end{array}$$

が可換となるもの。ただし、

$C_e: X \rightarrow G$ は G の単位元 e への定値写像。

(2) $\forall g, h \in G, \forall x \in X,$

$$\mu(\mu(x, g), h) = \mu(x, gh)$$

つまり)

$$\begin{array}{ccc} X \times G \times G & \xrightarrow{\mu \times 1_G} & X \times G \\ \downarrow 1 \times \mu_G & & \downarrow \mu \\ X \times G & \xrightarrow{\mu} & X \end{array}$$

\mathcal{A}^L 可換になる.

ここで、 $\mu_G : G \times G \rightarrow G$ は G の積.

同様に 左かゝりの作用

$$G \times X \rightarrow X$$

も定義される.

Rem 3.5.2

群の作用の定義に逆元は不要
なので、(Def 2.3.22) 及 (Def 3.5.1) は
そのまゝ位相モノイド⁴ に使えり.

例) 3.5.8

$G = O(n)$, $X = S^{n-1}$ とする.

$$O(n) \hookrightarrow GL_n(\mathbb{R})$$

$$S^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n$$

(\Leftarrow).

$GL_n(\mathbb{R})$ の \mathbb{R}^n への作用を制限する.

とすれば, $O(n)$ の S^{n-1} への作用が定義される.

(\Rightarrow)

示すには.

$$A \in O(n), v \in S^{n-1} \Rightarrow Av \in S^{n-1}.$$

$$\text{例) } v \in S^{n-1} \Leftrightarrow |v|^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (v, v) = 1$$

$$\Leftrightarrow {}^t v v = 1$$

よって. $Av \in S^{n-1}$ を示すには.

$${}^t(Av)(Av) = 1$$

を示せばよい.

$${}^t(Av)(Av) = {}^t v ({}^t A A) v$$

$$= {}^t v I_n v \quad (\because A \in O(n))$$

$$= {}^t v v = 1$$

□

ここで使ったのは、次の事実.

Lemma 3.5.9

G は、位相空間 X に 左から作用する位相群
とし、その作用を

$$\mu: G \times X \rightarrow X$$

とする.

H は G の 部分群.

A は X の 部分空間 として.

$$\mu(H \times A) \subset A$$

としてあるとする.

$\mu|_{H \times A}$ は H の A への作用.

(略証)

$$\begin{array}{ccc} (h_1, h_2, a) \in H \times H \times A & \xrightarrow{H \times \mu|_{H \times A}} & H \times A \ni (h_1, h_2 a) \\ \mu_H \times 1_A \downarrow & & \downarrow \mu|_{H \times A} \\ (h_1, h_2, a) \in H \times A & \xrightarrow{\mu|_{H \times A}} & A \ni h_1 \cdot (h_2 a) \\ & & \ni (h_1 h_2) \cdot a \end{array}$$

$\mu|_{H \times A} (H \times A) \subset A$ より上の図式は
誘導されるからである. μ が群の作用だから.

可換になる

- 一般の群の作用について.

$$\mu: G \times X \rightarrow X$$

と見れば写像だと見れば、その随伴

$$\begin{array}{ccc} \text{ad}(\mu): G & \longrightarrow & \text{Map}(X, X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \delta & \longmapsto & \text{ad}(\mu)(g) : x \mapsto \mu(g, x) \\ & & = g \cdot x \end{array}$$

がわかる。

(Prop 2.4.4) で、 $(G$ と X の位相を考慮したいとき)

「 X 上の G の (左) 作用」

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \\ \text{ad}(\mu): G & \longrightarrow & \text{Aut}(X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \delta & \longmapsto & \text{ad}(\mu)(g) \end{array}$$

が 一対一対応にあることを見た。

位相を考慮すると、写像 $\text{ad}(\mu)$ が $\text{Homeo}(X)$ に値をとる。

$$= \{ f: X \rightarrow X \mid \text{同相写像} \}$$

↑

このほか同位相で

位相もよく保っている。

Lem 3.5.14

G : 位相群, X : 位相空間 c.l.

$\mu: G \times X \rightarrow X$ $\text{c. } G \text{ の } X \text{ への作用と認.}$

このとき μ の 随伴

$$\text{ad}(\mu): G \rightarrow \text{Map}(X, X)$$

の 像 は $\text{Homeo}(X)$ に 含まれる.

よって $\text{ad}(\mu)$ は

$$\text{ad}(\mu): G \rightarrow \text{Homeo}(X)$$

への写像と可成せる.

⑦

各 $g \in G$ に対し $\text{ad}(\mu)(g)$ は 同相写像であることを示せばよい
(Prop 2.4.4) の 証明 同.

$\text{ad}(\mu)(g)$ と $\text{ad}(\mu)(g^{-1})$ は 互いに逆写像.

μ は 連続 同の c.l. とき $\text{ad}(\mu)$ も 連続. (Lem 3.4.2)

□

Lem 3.5.15

G : 位相空間 X に作用する位相群.

$\mu : G \times X \rightarrow X$; G の作用 μ である.

is a

$$\text{ad}(\mu) : G \longrightarrow \text{Homeo}(X)$$

は連続な準同型.

(\Leftarrow)

$\text{Homeo}(X)$ はコンパクトな位相で位相元ノドに付いている.

μ が連続なため. (Lem 3.4.7) より $\text{ad}(\mu)$ は連続.

(Prop 2.4.4) の証明から $\text{ad}(\mu)$ は準同型写像

以上により, 作用 $G \times X \rightarrow X$ から

連続な準同型 $G \rightarrow \text{Homeo}(X)$ が得られた.

Q.

逆に, $G \rightarrow \text{Homeo}(X)$ のような連続な準同型から

G の作用が作れるか?

Def 3.5.16

写像 $\varphi : X \rightarrow \text{Map}(Y, Z)$ に対し.

$$\text{ad}^{-1}(\varphi) : X \times Y \rightarrow Z.$$

z

$$\text{ad}^{-1}(\varphi)(x, y) = \varphi(x)(y) \quad (y \in Z)$$

z を定める.

Rem 3.5.17

$$\begin{array}{ccc} \text{ad} & : & \text{Map}(X \times Y, Z) \longrightarrow \text{Map}(X, \text{Map}(Y, Z)) \\ \cup & & \cup \\ \varphi & \longmapsto & \text{ad}(\varphi) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{ad}^{-1} & : & \text{Map}(X, \text{Map}(Y, Z)) \longrightarrow \text{Map}(X \times Y, Z) \\ \cup & & \cup \\ \varphi & \longmapsto & \text{ad}^{-1}(\varphi) \end{array}$$

ただしこの記号を用いた (これら随伴 adjoint の記号を用いた)

lem 3.5.18

Y が 局所コンパクト Hausdorff であるとき.

$$\varphi : X \rightarrow \text{Map}(Y, Z)$$

が連続である.

$$\text{ad}^{-1}(\varphi) : X \times Y \rightarrow Z$$

が連続

(i)

$U \subset Z$: 開集合 である.

$$(\text{ad}^{-1}(\varphi))^{-1}(U) = \{ (x, y) \in X \times Y \mid \varphi(x)(y) \in U \}$$

である. このとき $X \times Y$ の 開集合 であることはよい.

$$(x_0, y_0) \in (\text{ad}^{-1}(\varphi))^{-1}(U) \quad \text{に 対し.}$$

$$\varphi(x_0) : Y \rightarrow Z \quad \text{が 連続 である.}$$

$\varphi(x_0)^{-1}(U)$ は 開集合 である. である.

$Y \setminus \varphi(x_0)^{-1}(U)$ は y_0 を 含む はずの Y の 閉集合.

$$\leftarrow \varphi(x_0)(y_0) \in U \text{ である. } y_0 \in \varphi(x_0)^{-1}(U).$$

よって, Y は 局所コンパクト Hausdorff ならば正則

である. y_0 の 開近傍 V である.

$$\bar{V} \cap (Y \setminus \varphi(x_0)^{-1}(U)) = \emptyset$$

つまり, $\varphi(x_0)(\bar{V}) \subset U$ であることがわかる.

$$\bar{V} \subset \varphi(x_0)^{-1}(U)$$

また、 γ は 局所コンパクト だから、 \bar{V} はコンパクトと仮定してよい。
 すると、

$\varphi^{-1}(W(\bar{V}, U)) \times V$ は (x_0, y_0) の 周辺像 であり

$$\varphi^{-1}(W(\bar{V}, U)) \times V \subset (\text{ad}^{-1}(\varphi))^{-1}(U)$$

ゆえに、 $\text{ad}^{-1}(\varphi)$ は 連続。

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{\ast} \forall (x, y) \in \varphi^{-1}(W(\bar{V}, U)) \times V \quad \text{に よる。} \\ \varphi(x)(\bar{V}) \subset U \quad \text{より} \quad \varphi(x)(y) \in U \quad \therefore (x, y) \in (\text{ad}^{-1}(\varphi))^{-1}(U) \end{array} \right)$$

Cor 3.5.19

G : 位相群

X : 局所コンパクト Hausdorff 空間 である。

$\varphi : G \rightarrow \text{Homeo}(X)$ が 連続な準同型 である。

$$\text{ad}(\varphi) : G \times X \rightarrow X$$

は G が X への (位相群 としての) 作用、(連続)

(3) (lem 3.5.18) より $\text{ad}^{-1}(\varphi)$ は連続.
 上の $\text{ad}^{-1}(\varphi)$ が ρ 作用の条件を満たしていることを
 確認する.

(i) $\forall x \in X,$

$$\text{ad}^{-1}(\varphi)(e_g, x) = \varphi(e_g)(x) = x$$
 $(\because \varphi \text{ が } \rho \text{ 準同型 故の } \rho, \varphi(e_g) = \text{id}_X)$

(ii) $\forall g, h \in G, \forall x \in G,$

$$\text{ad}^{-1}(\varphi)(g, \text{ad}^{-1}(\varphi)(h, x)) = \text{ad}^{-1}(\varphi)(gh, x)$$
 を示す.

$$\begin{aligned} \text{(左辺)} &= \text{ad}^{-1}(\varphi)(g, \varphi(h)(x)) \\ &= \varphi(g)(\varphi(h)(x)) \\ &= (\varphi(g) \circ \varphi(h))(x) && (\varphi(g), \varphi(h) \in \text{Hom}(X)) \\ &= \varphi(gh)(x) && (\because \varphi \text{ は } \rho \text{ 準同型}) \\ &= \text{ad}^{-1}(\varphi)(gh, x) \\ &= \text{(右辺)} \end{aligned}$$

OK

□

Cor 3.5.20

X : 局所コンパクト Hausdorff かつ,

$\text{Homeo}(X)$ は X に連続に作用する。

⊖

$$\text{id}_{\text{Homeo}(X)} : \text{Homeo}(X) \rightarrow \text{Homeo}(X)$$

は連続な準同型だから、 φ として id をとることで、

上の系より $\text{Homeo}(X)$ の X への作用を述べた。

以降、 X が局所コンパクト Hausdorff のときは、

「位相群 G の X への連続な作用」

と

「連続な準同型 $G \rightarrow \text{Homeo}(X)$ 」

を同一視する。

改めて、 F 上の構造群を定義しよう。

3.2 節の $G \hookrightarrow \text{Homeo}(F)$ として連続なものを
考える。

Def 3.5.1 (正確な構造群の定義)

G : 局所コンパクト Hausdorff 空間 F に
連続に作用する位相群.

$G \rightarrow \text{Homeo}(F)$ を その作用による定常連続準同型

ファイバー束 (B, E, F) が G を 構造群 (Structure group)

とする (Steenrod の意味での) ファイバー束 であるとは.

$\{\Phi^{\alpha\beta}\}$ を その座標変換 としたとき.

任意の α, β に 対し.

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & \text{Homeo}(F) \\ & \swarrow \text{---} \Phi^{\alpha\beta} & \nearrow \Phi^{\alpha\beta} \\ & & U_\alpha \cap U_\beta \end{array}$$

が可換になるような連続写像 $\bar{\Phi}^{\alpha\beta}$ が存在することをいう.

例) 3.5.24

(例) 3.1.11) の Hopf 束 $S^3 \xrightarrow{p} S^2 \simeq \mathbb{C}P^1$
 上述の意味で S^1 を 構造群 に持つ
 $\mathbb{R}P^1$ -束 であることを見る。

p の 局所自明化 は次で与えられている:

$$\begin{cases} U_+ := S^2 \setminus \{(1,0)\} \\ U_- := S^2 \setminus \{(-1,0)\} \end{cases}$$

よって.

$$\varphi_+ : p^{-1}(U_+) \rightarrow U_+ \times S^1$$

$$\varphi_- : p^{-1}(U_-) \rightarrow U_- \times S^1$$


$$\varphi_+^{-1} : U_+ \times S^1 \rightarrow p^{-1}(U_+)$$

は.

$$\varphi_+(z_1, z_2) = \left(2|z_1|^2 - 1, 2z_1\bar{z}_1, \frac{z_2}{|z_2|} \right) \quad (z_1, z_2 \in \mathbb{C})$$

$$\varphi_-(z_1, z_2) = \left(2|z_1|^2 - 1, 2z_1\bar{z}_1, \frac{z_1}{|z_1|} \right)$$

$$\varphi_+^{-1}(x, z, w) = \left(\frac{zw}{2\sqrt{\frac{1-x}{2}}}, w\sqrt{\frac{1-x}{2}} \right) \quad \left. \begin{array}{l} x \in \mathbb{R} \\ z \in \mathbb{C} \\ w \in S^1 \subset \mathbb{C} \end{array} \right\}$$



よ、 z .

$$\varphi_- \circ \varphi_+^{-1} : (U_+ \cap U_-) \times \mathcal{N}' \rightarrow (U_+ \cap U_-) \times \mathcal{N}'$$

は、

$$\varphi_- \circ \varphi_+^{-1} (x, z, w) = \varphi_- \left(\frac{zw}{2\sqrt{\frac{1-x}{2}}}, w \sqrt{\frac{1-x}{2}} \right)$$

$$= \left(2 \frac{|zw|^2}{4 \cdot \left(\frac{1-x}{2}\right)} - 1, 2 \cdot \frac{zw}{2\sqrt{\frac{1-x}{2}}} \cdot w \sqrt{\frac{1-x}{2}}, \frac{zw}{2\sqrt{\frac{1-x}{2}}} \right)$$

$$= \left(\frac{|z|^2}{1-x} - 1, z, \frac{z}{|z|} w \right) \quad \begin{array}{l} (x^2 + |z|^2 = 1) \\ (w \in \mathcal{N}') \end{array}$$

$$= \left(x, z, \frac{z}{|z|} w \right)$$

よ、 z 座標変換

$$\Phi^{+-} : U_+ \cap U_- \longrightarrow \text{Homeo}(\mathcal{N}')$$

$$\text{は、} \quad \Phi^{+-}(x, z)(w) = \frac{z}{|z|} w \quad z'' \text{ と } z \text{ は } \neq \text{す。} \quad (w \in \mathcal{N}')$$

$$\text{よ、} \quad \frac{z}{|z|} \in \mathcal{N}' \quad z'' \text{ あり。}$$

よ.て.

$$\text{写像 } \bar{\Phi}^{\pm} : U_+ \cap U_- \rightarrow \mathcal{S}' \quad \varepsilon$$

$$\bar{\Phi}^{\pm} (x, z) = \frac{z}{|z|}$$

を定めれば、次の図式は可換となる.

$$\begin{array}{ccc} \frac{z}{|z|} \in \mathcal{S}' & \xrightarrow{\text{ad}(\mu)} & \text{Homeo}(\mathcal{S}') \\ \bar{\Phi}^+ \swarrow & & \searrow \Phi^+ \\ & U_+ \cap U_- & \\ & \downarrow & \\ & (x, z) & \end{array}$$

$\left. \begin{array}{l} \Phi^+(x, z) \\ : W \mapsto \frac{z}{|z|} W \end{array} \right\}$
 $\text{ad}(\mu)\left(\frac{z}{|z|}\right)(W)$
 $= \mu\left(\frac{z}{|z|}, W\right)$
 $= \frac{z}{|z|} W$

ここで、 $\text{ad}(\mu) : \mathcal{S}' \rightarrow \text{Homeo}(\mathcal{S}')$ は
 \mathcal{S}' の積による \mathcal{S}' 自身への作用から定まる準同型.

よ.て. Hopf 束の構造群は \mathcal{S}' ($\subset \text{Homeo}(\mathcal{S}')$) となる.

§3.2 の冒頭のように、「 Γ -束が自明束を
見出し合せて得られた」と考えたと...

Def 3.5.31

位相空間 X と X における同値関係 \sim に対し、
商集合 X/\sim の位相 \mathcal{O} を

$$\mathcal{O} = \{ \mathcal{U} \subset X/\sim \mid \pi^{-1}(\mathcal{U}) \text{ が } X \text{ で開} \}$$

で定義する。ここで、

$$\begin{array}{ccc} \pi : X & \longrightarrow & X/\sim & \text{は射影} \\ \downarrow & & \downarrow & \\ x & \longmapsto & [x] & \end{array}$$

この π を 商写像 または 等化写像 (quotient map) とする。

この位相を備えた X/\sim を X の同値関係 \sim による
商空間 (quotient space) とする。

位相 \mathcal{O} を 商位相 または 等化位相 (quotient topology) とする。

この概念を用いて、 B の open covering $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ と、
写像の集合 $\{\varphi^{\alpha\alpha'} : U_\alpha \cap U_{\alpha'} \rightarrow G\}_{\alpha, \alpha' \in A}$
が与えられたとき、

これを使って $\{U_\alpha \times F\}$ たちを貼り合わせて

B 上のファイバー束を得る方法は、次のようにする。

Thm 3.5.32

G : 位相群 U_1 .

G が位相空間 F に左作用しているとする。

また、位相空間 B の開被覆 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ と、

写像の集合

$$\{\Phi^{\alpha\alpha'} : U_\alpha \cap U_{\alpha'} \rightarrow G\}_{\alpha, \alpha' \in A}$$

と、

次の条件を満たすものが与えられているとする。

(1) $\Phi^{\alpha\alpha}$ は単位元の定値写像

$$(2) \forall x \in U_\alpha \cap U_{\alpha'}, \Phi^{\alpha\alpha'}(x) = \Phi^{\alpha\alpha'}(x)^{-1} \quad (G \text{ 中})$$

$$(3) \forall x \in U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2} \cap U_{\alpha_3}$$

$$\Phi^{\alpha_2\alpha_3}(x) \Phi^{\alpha_1\alpha_2}(x) = \Phi^{\alpha_1\alpha_3}(x)$$

このとき、 $\coprod_{\alpha \in A} (U_\alpha \times F)$ 上の同値関係 \sim を
次で定める:

$(\alpha, \gamma) \in U_\alpha \times F$ と $(\alpha', \gamma') \in U_{\alpha'} \times F$ に対し、

$$(\alpha, \gamma) \sim (\alpha', \gamma') \Leftrightarrow \alpha = \alpha' \text{ かつ } \bigoplus^{\alpha'} \gamma = \gamma'.$$

よして、その商空間 E .

$$E = \left(\coprod_{\alpha \in A} U_\alpha \times F \right) / \sim$$

よし、

写像 $p: E \rightarrow B$ ε

$$p([\alpha, \gamma]) = \alpha$$

で定義すると、

これはファイバー F , 構造群 G , 座標変換 $\{\bigoplus^{\alpha\alpha'}\}_{\alpha\alpha' \in A}$
のファイバー束となる。

準備 - 問 3.5.34

位相空間 X 上の同値関係 \sim に対し p とおくと,

$$p: X \rightarrow X/\sim$$

を商写像とす.

連続写像 $f: X \rightarrow Y$ に対し

$$x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

をみたすのは, $\bar{f}([x]) = f(x)$ によ

$$\bar{f}: X/\sim \rightarrow Y$$

は連続写像になる.

⑦

$$x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x') \quad \text{よって}$$

$$\bar{f}([x]) = f(x) = f(x') = \bar{f}([x'])$$

よって, \bar{f} は well-defined.

$U \subset Y$ を Y の開集合とす. f が連続なとき

$f^{-1}(U)$ は X の開集合.

$$\text{定義より} \quad f = \bar{f} \circ p$$

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ p \downarrow & \searrow f & \\ X/\sim & \xrightarrow{\bar{f}} & Y \end{array}$$

$$f^{-1} = p^{-1} \circ \bar{f}^{-1} \quad \text{となり,}$$

$$f^{-1}(U) = p^{-1}(\bar{f}^{-1}(U))$$

よって X の 開集合 なので, X/\sim の 商位相 の 定義 から $\bar{f}^{-1}(U)$ は X/\sim の 開集合.

ゆえに, $f : X/\sim \rightarrow Y$ は 連続写像 □

[Proof of Prop. 3.5.32]

p の 連続性は, 次の 図式 から:

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{\alpha \in A} \{U_\alpha \times F\} & & \\ \pi \downarrow & \searrow p_1 & \\ E & \xrightarrow{p} & B \end{array}$$

よって, 命 3.5.34 を 用いればよい.

次に, 局所自明化 を つくる.

$$\begin{array}{ccc}
 E & \xrightarrow{p} & B \\
 \cup & & \cup \\
 p^{-1}(U_\alpha) & & U_\alpha
 \end{array}$$

点 $e \in E$ について, $p(e) \in U_\alpha$ となる $\alpha \in A$ を選べる.

同値関係の定義より

$$e = [(p(e), \alpha)]$$

となる $\alpha \in F$ が一意に定まる.

この対応に対し 全単射

$$\varphi_\alpha : p^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$$

が得られる.

直積位相の定義より, これが連続であることを示すには,

それぞれ射影の合成

$$pr_1 \circ \varphi_\alpha : p^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \quad \dots \textcircled{1}$$

$$pr_2 \circ \varphi_\alpha : p^{-1}(U_\alpha) \rightarrow F \quad \dots \textcircled{2}$$

が連続であることを示せばよい.

① は \mathcal{P} の制限と一致するから、 \mathcal{P} が連続なことから連続。

② は、 $\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha : \mathcal{P}^{-1}(U_\alpha) \rightarrow F$ において、

$V \subset F$: F の開集合 に対し、

$(\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V)$ が $\mathcal{P}^{-1}(U_\alpha)$ の開集合

であることを示せばよい。 等化位相の定義より、

$$\pi : \coprod_{\alpha \in A} (U_\alpha \times F) \longrightarrow E$$

を射影としたとき、

$$\pi^{-1} \left((\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V) \right) \text{ が } \coprod_{\beta \in A} (U_\beta \times F) \text{ の開}$$

を示せばよい。

$$x \in U_\alpha \cap U_\beta \Rightarrow x \in \varphi_\beta^{-1}(V)$$

$$\pi^{-1} \left((\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V) \right) = \coprod_{\beta \in A} \left((U_\alpha \cap U_\beta) \times \varphi_\beta^{-1}(V) \right)$$

で、 $\varphi_\beta^{-1}(V)$ が同相写像だからわかる。右辺は開集合。

よって、 \mathcal{P} は \mathcal{P} 位相 - F の \mathcal{P} 位相 - 束。

同値関係の定め方が、座標変換は $\varphi^{\alpha\alpha'}$ として

与えられた、 $(x, y) \sim (x', y')$

$$\Leftrightarrow x = x' \text{ かつ } \varphi^{\alpha\alpha'}(x)y = y'.$$

□

[最後の部分が少し不明瞭]

$$\begin{array}{ccccc}
 e & \longmapsto & (p(e), \eta_e) & \longmapsto & \eta_e \\
 \cap & & \cap & & \\
 \text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha & : & p^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\varphi_\alpha} & U_\alpha \times F \xrightarrow{\text{pr}_2} F \\
 \cup & & \cup & & \cup \\
 \begin{array}{c} F \\ \updownarrow \\ \text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha \\ \downarrow \\ U_\alpha \end{array} & & (p \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V) & \rightarrow & U_\alpha \times V \rightarrow V \\
 \circlearrowleft U_\alpha & & \uparrow \varphi_\alpha^{-1}(\text{pr}_2^{-1}(V)) & & \nearrow \text{pr}_2^{-1}(V) \\
 \pi & & & &
 \end{array}$$

$$\coprod_{\alpha \in A} (U_\alpha \times F)$$

$$\pi^{-1}((\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V)) = \coprod_{\beta \in A} (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathcal{F}^{\alpha\beta}(p((\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V)))^{-1}(V)$$

$$= \coprod_{\beta \in A} (U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathcal{F}^{\beta\alpha}(p((\text{pr}_2 \circ \varphi_\alpha)^{-1}(V)))^{-1}(V)$$